

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang hubungan lama persalinan Kala II dengan penilaian *apgar score* pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai *apgar score* dari jumlah jumlah 44 bayi dengan kala II lama, yang memiliki *apgar score* normal berjumlah 2 orang dengan persentase 4,56%, sedangkan yang memiliki *Apgar Score* tidak normal sebanyak 42 orang dengan persentase 95,45%. Sedangkan dari jumlah 44 bayi dengan kala II normal, yang memiliki *Apgar Score* normal berjumlah 35 orang dengan persentase 79,55% sedangkan itu yang memiliki *Apgar Score* tidak normal berjumlah 9 orang dengan persentase 20,45%.
2. Kala II tidak normal sebagian besar memiliki *Apgar Score* tidak normal dengan jumlah 42 orang dengan persentase 95,45%. Sedangkan kala II normal, sebagian besar dalam kategori *Apgar Score* tidak normal yaitu berjumlah 35 orang dengan persentase 79,55%.
3. Terdapat hubungan lama persalinan Kala II dengan *apgar score* pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Tahun 2018 dengan *Chi square* ($p=0.000 < \alpha=0.05$) dengan nilai *Ods Ratio* 0,012.

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dapat meningkatkan pengetahuan tentang persalinan kala II lama dan selalu siaga terhadap kondisi-kondisi yang dapat membahayakan ibu maupun bayi, utamanya ibu yang mengalami persalinaan kala II lama. Untuk itu dibutuhkan keterbukaan terhadap kondisi pasien sehingga ibu dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi persalinan. Peningkatan ketrampilan petugas kesehatan melalui pelatihan tentang manajemen asfiksia neonatorum dan tehnik resusitasi agar mengurangi kematian bayi akibat asfiksia.
2. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti dalam menangani persalinan kala II lama yang serta penggunaan intervensi lain yang dapat mempengaruhi terjadinya asfiksia persalinaan kala II lama.