

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Ibu bersalin dengan lama persalinan kala II  $\geq 1$  jam ( $\geq 60$  menit) di Rumah Sakit Umum Daerah Bombana tahun 2018 sebanyak 27 ibu (7,3%).
2. Kadar HB ibu bersalin yang  $< 11$  gr% di Rumah Sakit Umum Daerah Bombana tahun 2018 sebanyak 25 ibu (46,3%).
3. Ada hubungan kadar hemoglobin (HB) dengan lama persalinan kala II di Rumah Sakit Umum Daerah Bombana Tahun 2018 ( $X^2=6,033$ ;  $pvalue=0,014$ ). Ibu bersalin yang memiliki kadar HB  $< 11$  gr% berisiko 4,038 kali mengalami kala II persalinan  $\geq 1$  jam dibandingkan ibu bersalin dengan kadar HB  $\geq 11$  gr% (OR= 4,038; CI95%= 1,295-12,585).

#### B. Saran .

1. Disarankan pada ibu hamil untuk memperhatikan asupan gizi pada masa kehamilan sehingga dapat terhindar dari anemia seperti mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi antara lain daging merah, telur, sayuran hijau, kacang polong dan lain-lain.
2. Bidan diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam penanganan persalinan kala II terutama jika terjadi kala II lama atau partus macet

- 
- 
3. Bagi institusi pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas untuk mengoptimalkan pelayanan pada kegawatdaruratan obstetrik bagi ibu yang mengalami persalinan lama.