

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 48 sampel (100%) hasil positif sebagian besar ditemukan pada stadium V dan tersebar pada semua titer *C-Reactive Protein* (CRP). Titer *C-Reactive Protein* (CRP) tertinggi pada penelitian ini yaitu 1:1024 (n=1) juga ditemukan pada stadium V. Selain itu juga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasien gagal ginjal kronik pada stadium III sebanyak 7 orang (15%) kemudian pada stadium IV sebanyak 5 orang (10%) dan pada stadium V sebanyak 36 orang (75%)
2. Gambaran *C-Reactive Protein* (CRP) pada pasien gagal ginjal kronik, pada stadium III hasil negatif sebanyak 3 orang, titer 1:16 yaitu sebanyak 2 orang, titer 1:2 dan 1:4 masing-masing sebanyak 1 orang. Pada stadium IV hasil negatif tidak ada subjek, titer 1:8 sebanyak 3 orang, titer 1:32 dan 1:1024 masing-masing sebanyak 1 orang. Dan 32 orang pada stadium V didapatkan hasil positif yang tersebar ke semua titer *C-Reactive Protein* (CRP) dan negatif sebanyak 4 orang.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pemeriksaan kadar *C-Reactive Protein* (CRP) menggunakan metode *High Sensitivity CRP* (Hs-CRP) karena memiliki nilai deteksi yang lebih sensitif.