

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Gambaran Bilirubin Total Pada Penderita Hepatitis B Di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan bilirubin total pada Penderita hepatitis B telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 sampel, dengan pasien hepatitis B berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 15 orang.
2. Pemeriksaan Gambaran Bilirubin Total Pada Penderita hepatitis B Di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi sebanyak 4 orang (13,3%) memiliki kadar bilirubin total normal dan 16 orang (86,7%) memiliki kadar bilirubin total yang tinggi.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar bilirubin total yang telah dilakukan pada penderita hepatitis B di dapat bahwa rata-rata kadar bilirubin total yang normal memiliki rentan nilai 0,87 mg/dL dan rata-rata kadar bilirubin total yang tinggi memiliki rentan nilai 7,9 mg/dL.

B. Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan lebih mengenali faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kadar bilirubin total pada penderita hepatitis B menjadi tinggi, dan juga disarankan dapat melanjutkan penelitian ini dengan variabel pemeriksaan yang berbeda seperti melakukan pemeriksaan bilirubin direk atau indirek pada penderita hepatitis B.