

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai gambaran kadar *C-Reactive Protein* (CRP) pada individu dengan keluhan nyeri tenggorokan, diperoleh jumlah pasien dengan kadar CRP positif lebih banyak yaitu 19 subjek (53%) dibandingkan dengan kadar CRP negatif yaitu 17 subjek (47%), dengan sebaran hasil antara 12 mg/L 13 subjek (36%), 24 mg/L 4 subjek (11%), dan 48 mg/L 2 subjek (6%).

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian mengenai perbedaan kadar CRP pada individu dengan keluhan nyeri tenggorokan berdasarkan lama nyeri yang diderita dengan menggunakan metode Sandwich ELISA dan Hs-CRP.
2. Kesalahan dalam pemeriksaan CRP dengan metode Aglutinasi Latex tidak bisa diabaikan dikarenakan hasil pengamatan ada atau tidaknya aglutinasi hanya berdasarkan analisis visual. Oleh karena itu, perlu diperhatikan secara teliti pada proses pra analitik, analitik, dan pasca analitik untuk menghindari terjadinya fenomena postzone dan pro zone.